

## 令和4年度 環境中のダイオキシン類の調査結果について

ダイオキシン類対策特別措置法第26条に基づき、令和4年度に奈良市が実施した環境中の大気、水質、土壌等のダイオキシン類の調査結果は、次のとおりです。

環境媒体	地点数	平均値	濃度範囲	環境基準
大気 (一般環境)	2	0.012	0.011 ~ 0.013	0.6
公共用水域水質 (河川)	2	0.10	0.099 ~ 0.11	1
公共用水域底質 (河川)	2	0.37	0.28 ~ 0.46	150
地下水質	2	0.115	0.080 ~ 0.15	1
土壌 (一般環境)	1	0.17	—	1,000

(単位：大気 pg-TEQ/m<sup>3</sup>  
水質 pg-TEQ/L  
底質 pg-TEQ/g  
土壌 pg-TEQ/g)

環境中の大気、公共用水域水質、公共用水域底質、地下水質、土壌のダイオキシン類について、市内9地点で調査を実施した。  
その結果、大気、公共用水域水質、公共用水域底質、地下水質、土壌の全地点において環境基準を達成していた。

### 測定方法

#### 大気

「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」

(平成20年3月環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室、大気環境課)

#### 公共用水域水質及び地下水質

JIS K 0312

(工業用水・工場排水中のダイオキシン類の測定方法)

#### 公共用水域底質

「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」

(平成21年3月環境省 水・大気環境局水環境課)

#### 土壌

「ダイオキシン類に係る土壌調査測定マニュアル」

(平成21年3月環境省 水・大気環境局土壌環境課)

## 用語解説


- ・ ダイオキシン類  
ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDD)、ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF)  
及びコプラナーポリ塩化ビフェニル (コプラナーPCB) の総称
- ・ pg (ピコグラム)  
g (グラム) の 1 兆分の 1 の重量を表す単位
- ・ TEQ (毒性等量)  
ダイオキシン類の実測濃度にTEF (ダイオキシン類の異性体の中で最も毒性の強い 2, 3, 7, 8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (2, 3, 7, 8-TCDD) の毒性を 1 としたときの他の異性体の相対的な毒性) を乗じて合計したもの

ダイオキシン類（大気）調査結果（令和4年度）

（単位：pg-TEQ/m<sup>3</sup>）

調査地点	調査月	7月	1月	平均値	環境基準
西部大気汚染測定局 （百楽園四丁目）		0.012	0.013	0.013	0.6
奈良市立春日中学校 （西木辻町）		0.013	0.011	0.012	

<大気経年変化>



ダイオキシン類（公共用水域（水質・底質））調査結果（令和4年度）

（単位：水質 pg-TEQ/L）  
（底質 pg-TEQ/g）

調査地点	調査月	水質 （環境基準：1）	底質 （環境基準：150）
大和川水系（富雄川） 大和田橋（石木町）	11月	0.11	0.28
大和川水系（菩提川） 菩提川流末（恋の窪三丁目）	11月	0.099	0.46

ダイオキシン類（地下水質）調査結果（令和4年度）

（単位：pg-TEQ/L）

調査地点	調査月	調査結果	環境基準
奈良阪町	11月	0.080	1
芝新屋町	11月	0.15	

ダイオキシン類（土壌）調査結果（令和4年度）

（単位：pg-TEQ/g）

調査地点	調査月	調査結果	環境基準
法蓮町（若草中学校）	11月	0.17	1,000